



## Vorbereitung zur Darmspiegelung mit Moviprep - Termin morgens zwischen 07.00 – 08.00 Uhr -

### Ihr Termin: \_\_\_\_\_

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  
bitte verständigen Sie uns spätestens 48 Stunden vor Ihrem geplanten Termin, sollten Sie die Darmspiegelung nicht wahrnehmen können. (Tel.: 0221-92 16 08 0 oder 0221-92 16 08 22)

Die Darmspiegelung ist eine Untersuchungsmethode, bei der die Darmschleimhaut betrachtet wird. Um hier auch feinste Veränderungen erkennen zu können, muss der Darm sehr sauber sein. Dies bedarf Ihrer sorgfältigen Vorbereitung. Bitte richten Sie sich nur nach unseren Anweisungen und lassen Sie die Einnahmevergaben auf dem Moviprep Beipackzettel außer Acht.

### **Während der 5 Tage vor der Darmspiegelung bitten wir Sie zu beachten:**

Essen Sie keine Obst- oder Gemüsesorten mit kleinen Kernen (z.B. Weintrauben, Kiwi, Erdbeeren, Himbeeren), keine Blattsalate, Pilze, Mais, Tomaten, Gurken, Zucchini, Nüsse etc.. Nehmen Sie keine Füll- oder Quellmittel ein (z.B. Weizenkleie, Leinsamen, Agiocur, Metamucil u.ä.) Sollten Sie diese Mittel zur besseren Verdauung benötigen, so weichen Sie in diesen Tagen bitte auf Abführzäpfchen aus (z.B. Dulcolax). Verzichten Sie außerdem auf ballaststoffreiche Kost jeglicher Art, wie Vollkornbrot, Vollkornbrötchen oder Müsli.

### **Am Tag vor der Untersuchung:**

**Frühstück:** Toastbrot mit Käse, Wurst oder Gelee.

**Danach nehmen Sie bitte bis zur Untersuchung keine feste Nahrung mehr zu sich.**

Ebenso gelten für die Getränke folgende Regelungen: Erlaubt sind stilles Wasser, Kamillentee, verdünnte, klare Apfelschorle oder klare Brühe ohne Einlage. Verzichten Sie während der Abführmaßnahmen auf Kaffee, schwarzen Tee, Früchtetees, Fruchtsäfte, kohlenstoffhaltige Getränke und Milchprodukte.

### **KEIN MITTAG- UND ABENDESSEN!**

**14.00 Uhr** Aus einer Packung Moviprep füllen Sie den großen Beutel A und den kleinen Beutel B in ein Gefäß und geben 1 Liter Wasser hinzu. Verrühren Sie das Ganze bis die Flüssigkeit nahezu klar ist und trinken Sie diese glasweise alle 10-15 Minuten. Vor der Einnahme kann das Abführmittel vorbereitet und gekühlt werden. Zusätzlich trinken Sie bitte 1 Liter von den erlaubten Getränken.

### **Bitte beachten:**

Zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr trinken Sie zusätzlich 1-2 Liter Flüssigkeit. Hierbei gelten die o.a. erlaubten Getränken, wobei zum Abend ein Glas Weißwein oder ein Glas Bier getrunken werden darf.

**19.00 Uhr** Aus der zweiten Packung Moviprep füllen Sie den großen Beutel A und den kleinen Beutel B in ein Gefäß und geben 1 Liter Wasser hinzu. Verrühren Sie das Ganze bis die Flüssigkeit nahezu klar ist und trinken Sie diese glasweise alle 10-15 Minuten. Vor der Einnahme kann das Abführmittel vorbereitet und gekühlt werden. Zusätzlich trinken Sie 1-2 Liter von den erlaubten Getränken.

Blatt bitte wenden!



## Am Untersuchungstag:

### **KEIN FRÜHSTÜCK!**

**Bis 1 Stunde bevor Sie das Haus verlassen, um in unsere Praxis zu kommen:**

Darf eine Tasse Kaffee oder schwarzer Tee (ohne Milch) zu sich genommen werden. Zusätzlich können Sie von den erlaubten Getränken trinken.

### Hier noch weitere wichtige Informationen für Sie:

- ⇒ Sollten Sie gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, setzen Sie diese nur **NACH** Rücksprache mit Ihrem Hausarzt oder Kardiologen ab.
- ⇒ Wünschen Sie eine Beruhigungsspritze zur Untersuchung, so ist die aktive Teilnahme am Straßenverkehr (z. B. Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahren) und das Bedienen von Maschinen am Untersuchungstag nicht erlaubt. Wir raten Ihnen, sich nach der kurzen Aufwachphase abholen zu lassen.
- ⇒ Insulinpflichtige Patienten dürfen sich morgens vor der Untersuchung **keine Spritze** geben. Wir bitten Sie aus diesem Grund, Ihr übliches Frühstück nach der Untersuchung in der Praxis einzunehmen. Bei Bedarf kann während der Abführmaßnahmen Traubenzucker eingenommen werden.
- ⇒ Die regelmäßige Einnahme der Antibabypille muss durch die Koloskopievorbereitung nicht unterbrochen werden. Jedoch ist zu beachten, dass durch die Abführmaßnahme ein Empfängnischutz nur unzureichend gewährleistet ist. Wir empfehlen zusätzliche Verhütungsmittel bis zum Ende des Zyklus.
- ⇒ Durch das Abführen ist es möglich, dass Ihr Analbereich gereizt wird. Zur Linderung können Sie gerne eine Wund- und Heilsalbe (z. B. Bepanthen) auftragen.
- ⇒ Bitte bringen Sie zur Untersuchung ein großes Handtuch (50x100 cm oder 70x140 cm) mit.
- ⇒ Frauen, die am Untersuchungstag ihre Periode erwarten, empfehlen wir Tampons zu verwenden.
- ⇒ In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass weitere Abführmaßnahmen in der Praxis durchgeführt werden müssen; der Aufenthalt in der Praxis kann sich dann von durchschnittlichen 2 Stunden auf bis zu 3 Stunden ausdehnen.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Praxisteam gerne zur Verfügung.

PD Dr. med. C. Barmeyer

Prof. Dr. med. C. Bojarski